

# INSETTICIDI



**Insetticida-acaricida liquido a base di Abamectina autorizzato su un ampio spettro di colture.**

**Vasco®** è un insetticida-acaricida di derivazione naturale che agisce per contatto e ingestione. Penetra rapidamente con movimento translaminare formando una riserva attiva il cui deposito superficiale (prodotto non assorbito) si degrada alla luce solare quindi non interferisce con gli insetti utili. Persiste all'interno della vegetazione prolungando il periodo utile di attività. Controlla i parassiti su entrambe le pagine fogliari ed è attivo contro acari, eriofidi, minatrici, psilla.

| COMPOSIZIONE                   | GRUPPO IRAC | FORMULAZIONE                   | CLASSIFICAZIONE CLP                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abamectina pura 1,89% (18 g/l) | 3 A         | Concentrato Emulsionabile (EC) |  <b>PERICOLO</b><br>Registrazione n°: 16492 del 24/11/2015 |



Flacone: 1 L  
Cartone: 12x1 L  
Pallet: 600 L



Tanica: 5 L  
Cartone: 4x5 L  
Pallet: 480 L

Visita  
la pagina  
prodotto!



## EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

| COLTURA                                                                                   | AVVERSITÀ                                                                                                                           | DOSE   |          | EPOCA D'IMPIEGO                                        | N. TRATTAMENTI   | PHI (gg) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------|------------------|----------|
|                                                                                           |                                                                                                                                     | ml/hl  | l/ha     |                                                        |                  |          |
| POMODORO<br>(serre permanenti)                                                            | Ragnetti rossi<br>( <i>Tetranychus urticae</i> ,<br><i>Polyphagotarsonemus latus</i> )<br>Eriofide<br>( <i>Aculus lycopersici</i> ) | 50-100 | 0,15-1   | Alla comparsa delle prime<br>forme mobili              | 1-3<br>Ogni 7 gg | 3        |
|                                                                                           | Minatrici fogliari<br>( <i>Liriomyza</i> spp.)                                                                                      |        |          | Alla comparsa delle prime<br>punture di ovodeposizione |                  |          |
| MELANZANA<br>(serre permanenti)                                                           | Ragnetto rosso<br>( <i>Tetranychus urticae</i> )                                                                                    | 50-80  | 0,15-0,8 | Alla comparsa delle prime<br>forme mobili              | 1-2<br>Ogni 7 gg |          |
| MELONE, ZUCCA,<br>COCOMERO<br>CETRIOLO,<br>CETRIOLINO,<br>ZUCCHINO*<br>(serre permanenti) | Ragnetto rosso<br>( <i>Tetranychus urticae</i> )                                                                                    | 50-100 | 0,15-1   | Alla comparsa delle prime<br>punture di ovodeposizione |                  |          |
|                                                                                           | Minatrici fogliari<br>( <i>Liriomyza</i> spp.)                                                                                      |        |          | Alla comparsa delle prime<br>punture di ovodeposizione |                  |          |
| FRAGOLA*<br>(serre permanenti)                                                            | Ragnetti rossi e gialli<br>( <i>Tetranychus urticae</i> ,<br><i>Phytonemus pallidus</i> )                                           |        |          | Alla comparsa delle prime<br>forme mobili              |                  |          |
|                                                                                           | Minatrici fogliari<br>( <i>Liriomyza</i> spp.)                                                                                      |        |          | Alla comparsa delle prime<br>punture di ovodeposizione |                  |          |

\* Non trattare nel periodo invernale compreso tra Novembre e Febbraio

## VANTAGGI

- Ampio spettro d'azione.
- Nessuna resistenza incrociata con altri insetticidi e acaricidi.
- Compatibile con altri prodotti in miscela.
- Ridotti tempi di carenza su pero, melo, melanzana, fragola, lattughe, vite e pomodoro.