

# CYTHRIN® MAX



**CYTHRIN® MAX** è un insetticida in emulsione concentrata a base di cipermetrina. Controlla un largo numero di parassiti delle colture arboree ed erbacee. È un insetticida non sistemico che agisce per contatto ed ingestione.

**COMPOSIZIONE** Cipermetrina pura g 47,46 (500 g/L)

**FORMULAZIONE** Emulsione concentrata

**INTERVALLO DI SICUREZZA** 28 gg per frumento, orzo, segale, triticale, avena, farro; fino a completa fioritura per mais; 21 gg per colza, senape, cotone e vite; 14 gg per barbabietola da zucchero e da foraggio, bietola rossa, rutabaga, rapa e tabacco; 7 gg per erba medica; 3 gg per tutte le altre colture ad esclusione di pioppo, olivo (piante non in produzione), ornamentali e forestali per i quali non è previsto un intervallo di sicurezza.

**N° DI REGISTRAZIONE** 14232 del 05.10.2011

**CONFEZIONE** L 0,5

**INDICAZIONI DI PERICOLO** **PERICOLO**  
H226 - H304 - H315 - H318  
H302+H332 - H335 - H336  
H373 - H410 - EUH401



| COLTURE                                                                                                                                                           | AVVERSITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DOSE (mL/ha) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  <b>Frumento, Orzo, Segale, Triticale, Avena, Farro</b>                          | Afidi vettori della BYDV, Afidi, Nottua delle Messi ( <i>Agrotis segetum</i> ), Tortricide ( <i>Cnephasia spp.</i> ), Lema ( <i>Oulema spp.</i> ) Cricocera ( <i>Crioceris spp.</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50           |
|  <b>Mais da foraggio e da granella</b>                                          | Piralide ( <i>Ostrinia nubilalis</i> ), Sesamia ( <i>Sesamia cretica</i> ), Nottua gialla ( <i>Heliothis armigera</i> ), Nottua delle messi ( <i>Agrotis segetum</i> ), Diabrotica ( <i>Diabrotica spp.</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150          |
|  <b>Colza (invernale e primaverile), Senape</b>                                | Altica ( <i>Psylliodes chrysocephala</i> , <i>Phyllotreta atra</i> ), Punteruolo ( <i>Ceuthorrhynchus napi</i> ), Cecidomia delle silique ( <i>Dasyneura brassicae</i> ), Meligete del colza ( <i>Meligethes aeneus</i> ), Cetonella pelosa ( <i>Tropinota hirta</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50           |
|  <b>Cotone</b>                                                                 | Nottuidi terricoli ( <i>Heliothis armigera</i> , <i>Pectinophora gossypiella</i> , <i>Earias insulana</i> , <i>Agrotis segetum</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> ), Afidi, Mosca Bianca ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> ), Tripide del tabacco ( <i>Thrips tabaci</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100          |
|  <b>Broccoli, Cavolfiori, Cavoli a testa</b>                                   | Altica ( <i>Phyllotreta spp.</i> ) e Dorifora ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> ), Mosca Bianca ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> ), Afidi ( <i>Myzus spp.</i> e <i>Aphis spp.</i> ), Diabrotica ( <i>Diabrotica spp.</i> ), Cicaline ( <i>Empoasca spp.</i> ), Tripidi, Nottuidi terricoli e fogliari ( <i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Phthorimaea operculella</i> , <i>Pieris spp.</i> , <i>Plutella spp.</i> , <i>Mamestra spp.</i> , <i>Autographa spp.</i> , <i>Agrotis segetum</i> , etc.)                   | 100          |
|  <b>Piselli e Fagioli freschi</b>                                              | Tripidi, Sitona ( <i>Sitona lineatus</i> ), Afidi, Nottuidi terricoli e fogliari ( <i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Phthorimaea operculella</i> , <i>Pieris spp.</i> , <i>Plutella spp.</i> , <i>Mamestra spp.</i> , <i>Autographa spp.</i> , <i>Agrotis segetum</i> , etc.)                                                                                                                                                                                                                                           | 100          |
|  <b>Asparago</b>                                                               | Criocera dell'asparago ( <i>Crioceris asparagi</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100          |
|  <b>Carciofo</b>                                                               | Afidi, Nottue del carciofo ( <i>Gortyna xanthenes</i> - <i>G. flavago</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100          |
|  <b>Cipolla, Scalogno, Aglio</b>                                               | Nottuidi terricoli e fogliari ( <i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Phthorimaea operculella</i> , <i>Pieris spp.</i> , <i>Plutella spp.</i> , <i>Mamestra spp.</i> , <i>Autographa spp.</i> , <i>Agrotis segetum</i> , etc.), Tignola del porro ( <i>Acrolepiopsis assectella</i> ), Dorifora ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> ), Afidi ( <i>Myzus spp.</i> e <i>Aphis spp.</i> ), Diabrotica ( <i>Diabrotica spp.</i> ), Cicaline ( <i>Empoasca spp.</i> ), Tripidi, Mosca Bianca ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> ) | 100          |
|  <b>Melone, Zucche, Cocomeri ed altre Cucurbitacee a buccia non edibile</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|  <b>Pomodoro e Melanzana</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|  <b>Barbabietola da zucchero e da Foraggio, Bietola rossa, Rutabaga e Rapa</b> | Cleono ( <i>Conorrhynchus mendicus</i> ) e Lisso ( <i>Lixus junci</i> ), Afidi ( <i>Myzus spp.</i> e <i>Aphis spp.</i> ), Mosca Bianca ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> ), Cassida ( <i>Cassida vittata</i> ), Nottuidi terricoli e fogliari ( <i>Heliothis armigera</i> , <i>Trichoplusia sp.</i> , <i>Euxoa ochrogaster</i> , <i>E. scakens</i> , <i>E. tessellata</i> , <i>Agrotis segetum</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Phthorimaea operculella</i> )                                                                               | 100          |

| COLTURE                                                                                                                                                                      | AVVERSITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DOSE (mL/ha)                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  <b>Carote, Sedano Rapa, Ravanelli, Scorzonera, Rafano, Pastinaca, Radici di Prezzemolo</b> | Nottuidi terricoli e fogliari, ( <i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Phthorimaea operculella</i> , <i>Pieris spp.</i> , <i>Plutella spp.</i> , <i>Mamestra spp.</i> , <i>Autographa spp.</i> , <i>Agrotis segetum</i> , etc.), Altica ( <i>Phyllotreta spp.</i> ) e Dorifora ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> ), Afidi ( <i>Myzus spp.</i> and <i>Aphis spp.</i> ), Cicaline ( <i>Empoasca spp.</i> ), Tripidi, Mosca Bianca ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> ) | 100                             |
|  <b>Patata</b>                                                                              | Afidi ( <i>Myzus spp.</i> and <i>Aphis spp.</i> ), Tignola della patata ( <i>Phthorimaea operculella</i> ), Dorifora ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80 - 100                        |
|  <b>Vite da vino e da tavola</b>                                                            | Tignole della vite ( <i>Lobesia botrana</i> , <i>Eupoecillia ambiguella</i> ), Tortricidi ( <i>Sparganothis pilleriana</i> ), Sigaraio della vite ( <i>Byctiscus betulae</i> ), Cicalina ( <i>Scaphoides titanus</i> ), Cicalina verde ( <i>Empoasca vitis</i> )                                                                                                                                                                                                                              | 60                              |
|  <b>Olivo (piante non in produzione)</b>                                                    | Tignola dell'olivo ( <i>Prays oleae</i> ) (generazione antofaga e carpofaga), Mosca delle olive ( <i>Bactrocera oleae</i> ), Tignola verde ( <i>Palpita unionalis</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8-10 mL/hL<br>Dose massima:100  |
|  <b>Erba Medica</b>                                                                         | Mosca Bianca ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> ), Crisomelide nero ( <i>Colaspidea atrum</i> ), Punteruolo ( <i>Phytonomus variabilis</i> ), Afidi ( <i>Myzus spp.</i> and <i>Aphis spp.</i> ), Tripidi, Nottuidi terricoli e fogliari ( <i>Heliothis armigera</i> , <i>Pratyedra gossypiella</i> , <i>Earias insulana</i> , <i>Agrotis segetum</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> )                                                                                                         | 100                             |
|  <b>Tabacco</b>                                                                             | Cassida ( <i>Cassida vittata</i> ), Afidi ( <i>Myzus spp.</i> and <i>Aphis spp.</i> ), Mosca Bianca ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> ), Tripidi, Nottuidi terricoli e fogliari ( <i>Heliothis armigera</i> , <i>Trichoplusia spp.</i> , <i>Euxoa ochrogaster</i> , <i>E. scadens</i> , <i>E. tessellata</i> , <i>Agrotis segetum</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Phthorimaea operculella</i> )                                                                                      | 100                             |
|  <b>Floreali, Ornamentali</b>                                                             | Afidi, Tortrice mediterranea ( <i>Cacoecimorpha pronubana</i> ) e Bega del Garofano ( <i>Epichoristodes acerbella</i> ), Tripidi, Mosca Bianca, Minatori delle foglie, Nottuidi terricoli e fogliari                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10-20 mL/hL<br>Dose massima:100 |
|  <b>Pioppo in vivaio e giovani impianti</b>                                               | Afidi, Saperda ( <i>Saperda carcharias</i> ) e Criptorrinco ( <i>Cryptorhynchus lapathi</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 mL/hL<br>Dose massima:100    |
|  <b>Forestali in vivaio</b>                                                               | Limantria ( <i>Lymantria dispar</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 mL/hL<br>Dose massima:100     |

- Potente e immediata azione abbattente
- Contiene un'alta concentrazione di principio attivo
- La bassissima dose per ettaro lo rende particolarmente adatto al trattamento di grandi superfici
- Attivo contro larve, neanidi ed adulti

