

Kelly R DF

Granuli idrodispersibili

FUNGICIDA PER LA DIFESA DI VITE, POMODORO ed ORNAMENTALI.

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)

Rame metallo (da ossicloruro tetramico).....g.	25
Fosetil alluminio.....g.	25
Coformulanti.....q. b. a g.	100

Registrazione Ministero della Salute n° 12714 del 28/11/08

Titolare della registrazione: ISAGRO S.p.A. Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901209 (emergenze).

Distribuito da: Sumitomo Chemical Italia S.r.l., via Caldera 21, 20153 Milano, tel 02442801

Stabilimenti di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina).

Indicazioni di Pericolo

H318 Provoca gravi lesioni oculari - H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata - EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di prudenza

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini - P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. - P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare - P273 Non disperdere nell'ambiente - P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito - P501 Smaltire il contenuto/recipienti in conformità alla regolamentazione locale/nazionale

Contenuto netto: g 200, 250, 500 – **kg** 1, 1.5,2, 2.5, 3, 3.5,4,5, 6,7,8,9,10, 12,14, 15, 20

Partita N°.....



PERICOLO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole alle strade]. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Fosetil alluminio 25%, Rame 25%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

FOSETIL ALLUMINIO. --

RAME. Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni

CARATTERISTICHE

Kelly R DF è un'associazione di due principi attivi dalle caratteristiche complementari. Il rame dotato di azione di copertura e il Fosetil alluminio dotato di sistema ascendente è in grado di proteggere la vegetazione che si sviluppa dopo il trattamento garantendo quindi lunga persistenza d'azione.

Kelly R DF è particolarmente efficace nei confronti delle Peronosporacee e, data la presenza del rame, presenta anche una efficacia battericida.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con attrezzature a volume normale (1000 l/ha per la vite),-i, 600-800 l/ha per il pomodoro) e ornamentali. Nel caso di impieghi a volume ridotto, adeguare di conseguenza la concentrazione in modo da rispettare le dosi indicate per unità di superficie.

Vite - Peronospora della vite (*Plasmopara viticola*): Applicare il prodotto dopo la fioritura e in modo preventivo (prima della comparsa della malattia) alla dose di 250-400 g per 100 litri d'acqua (pari a 2,5-4 kg/Ha) ogni 8-12 giorni, con un massimo di 4 applicazioni. Adottare la dose più alta solo su varietà sensibili e forme espanse quando le condizioni climatiche (quali previsioni di piogge o nebbie) possono favorire lo sviluppo della malattia.

Pomodoro - Peronospora del pomodoro (*Phytophthora infestans*), Alternariosi delle solanacee (*Alternaria solani*) Septoria del pomodoro (*Septoria lycopersici*) - Batteriosi (*Pseudomonas syringae*, *Xanthomonas campestris*): Intervenire prima della comparsa delle malattie, alla dose di 3 kg/ha ogni 8-12 giorni. Adottare gli intervalli più brevi quando le piante sono nelle fasi di maggiori suscettibilità alla malattia, con un massimo di 4 applicazioni

Ornamentali - *Peronospora spp.* - *Bremia spp.* - *Phytophthora* (Peronospore delle ornamentali): irrorazioni fogliari preventive alla dose di 300 g per 100 litri d'acqua.

È consigliato l'uso di un agente antischiuma.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina (polisolfuri, *etc.*), e con i concimi fogliari azotati.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

GESTIONE DELLE RESISTENZE

Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare Kelly R DF a prodotti aventi differente meccanismo d'azione.

FITOTOSSICITÀ

Su varietà poco note di colture orticole ed ornamentali od in caso di dubbi è necessario compiere piccoli saggi preliminari prima di estendere il trattamento all'intera superficie.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER POMODORO, 40 GIORNI PER VITE

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Etichetta autorizzata con DD del 20 novembre 2018