



FENGIB® (GA3 0,5% + MCPA 1%)

N.Registrazione
Reg. n. 14582 del 30.04.2009
Intervallo di sicurezza: 20 gg

Confezioni
FLACONI 10 x 1 L

Composizione
GA3 (Acido Gibberellico) puro 0,5 g (=5 g/L)
MCPA estere tioetilico puro 1 g (=10 g/L)
Coformulanti e solventi: quanto basta a 100 g

Descrizione prodotto

FENGIB® è un regolatore di crescita in emulsione concentrata che stimola l’induzione florale e l'allegagione. I frutti risultano di dimensione maggiore e di pezzatura uniforme.

Avvertenze



Indicazioni di pericolo: H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH 401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



Coltura	Impiego	Dosaggio	Trattamento
Agrumi	Fogliare	Distribuire un quantitativo d'acqua pari a 15-20 hl/ha.	
Arancio	Fogliare	75-100 ml/hl	1° intervento, a 100 % di caduta petali, alla dose di 2 L/ha 2° intervento, con frutti di diametro di circa 30 mm, alla dose di 1,5 - 2 L/ha.
Clementine	Fogliare	25-100 ml/hl	Fioritura uniforme: 1° intervento, a 80 % di caduta petali, alla dose di 1,5-2 L/ha; 2° intervento, con frutti aventi diametro di circa 15 mm, alla dose di 1,5-2 L/ha; 3° intervento (eventuale), nella prima decade di settembre alla dose di 0,50-0,65 L/ha. Fioritura non uniforme: 1° intervento, a 70 % di caduta di petali, alla dose di 1,5-2 L/ha; 2° intervento, a luglio (dopo cascola naturale) alla dose di 1-1,5 L/ha; 3° intervento, nella prima decade di settembre alla dose di 0,5-0,65 L/ha
Satsuma	Fogliare	50-100 ml/hl	1° intervento, a 50-70 % di caduta petali, alla dose di 1L/ha; 2° intervento, con frutti di diametro di circa 15-20 mm, alla dose di 1,5 L/ha.
Limone	Fogliare	50-100 ml/hl	1° intervento, a 50-100 % di caduta petali, alla dose di 1,5-2 L/ha; 2° intervento, 10 giorni dopo il primo intervento, alla dose di 1 L/ha.
Pero	Fogliare	100-125 ml/hl	Intervenire al 10-30 % di fiori aperti, con 1,5 L/ha
Fragola	Fogliare	40-50 ml/hl	1° intervento, a bottone verde, alla dose di 0,4-0,5 L/ha; 2° intervento, 10 giorni dopo il precedente, alla dose di 0,4-0,5 L/ha
Melanzana, peperone	Fogliare	30-50 ml/hl	1° intervento, a inizio fioritura; 2° intervento a 10 giorni dal precedente.
Cocomero, melone	Fogliare	30-50 ml/hl	1° intervento, a inizio fioritura; 2° intervento a 15 giorni dal precedente
Pomodoro	Fogliare	30-40 ml/hl	Intervenire a inizio fioritura solo sui grappoli florali

Note aggiuntive prodotto

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle Indicazioni di pericolo ed i consigli di prudenza riportati in etichetta.