



GIBER GOBBI 10 (GA3 10%)

Fitoregolatore stimolante polivalente.

N.Registrazione

Reg. del Min. Salute n. 14531 del 28/01/2011

Intervallo di sicurezza: 20 gg

Composizione

GA3 (Acido Gibberellico) puro 10 g (=100 g/kg)

Coformulanti q. b. a 100 g

Confezioni

SCATOLE

30 x 10 compresse da 10 g

Descrizione prodotto

Fitoregolatore stimolante polivalente.

Modalità d'uso

Il prodotto va disciolto in acqua e spruzzato sulla parte aerea delle colture.

Avvertenze



Indicazioni di pericolo: H319 Provoca grave irritazione oculare.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.



Coltura	Impiego	Dosaggio	Trattamento
Melo	Fogliare	1-2 cp/hl	Per prevenire la rugginosità, favorire l'uniformità di pezzatura e l'allungamento dei frutti secondo gli standard varietali, intervenire ad inizio caduta petali. Proseguire con altri 3 trattamenti ad intervalli di 10 giorni alla stessa dose.
Pero	Fogliare	1-2 cp/hl	Per migliorare l'allegagione nelle varietà di difficile impollinazione o partenocarpiche. Trattare con 10 hl/Ha di acqua quando il 20-30 % di fiori sono aperti nelle aree settentrionali e quando il 90 % dei fiori sono aperti nelle aree meridionali. Si sconsiglia l'impiego sulla varietà Decana del Comizio.
Vite: Uva da tavola senza semi	Fogliare	1-4 cp/hl	Per allungare il rachide trattare in pre-fioritura con tralcio lungo 4-8 centimetri, impiegando 3 hl d'acqua per ettaro. Per diradare il grappolo, trattare al 30-40% della fioritura impiegando 6 hl d'acqua per ettaro. Per aumentare le dimensioni degli acini trattare dopo l'allegagione con acini di 3-4 mm di diametro, impiegando 10 hl d'acqua per ettaro. Per ottenere acini più omogenei o più grandi ripetere il trattamento dopo 8-10 giorni.
Vite: Uva da tavola con semi	Fogliare	0,5-1 cp/hl	Per aumentare le dimensioni degli acini trattare dopo l'allegagione con acini di 3-4 mm di diametro, impiegando 10 ettolitri d'acqua per ettaro. Per ottenere acini più omogenei o più grandi ripetere il trattamento dopo 8-10 giorni.
Arancio	Fogliare	1 cp/hl	Per migliorare la qualità della buccia. Trattare dopo l'invaiaura, impiegando 25 hl/ha di soluzione.
Limone	Fogliare	1-2 cp/hl	Per ritardare la raccolta e ridurre la presenza di frutti piccoli. Trattare prima dell'invaiaura.
Clementino e mandarino	Fogliare	1 cp/hl	Per migliorare l'allegagione, specie negli ibridi di scarsa produzione. Trattare in piena fioritura, per i mandarini, e quando i 2/3 dei petali dei fiori sono caduti, per i clementini, bagnando completamente le piante.
Ciliegio dolce	Fogliare	1 cp/hl	Per aumentare la consistenza e la pezzatura. Trattare all'invaiaura impiegando circa 10 hl/ha d'acqua.
Ciliegio acido	Fogliare	2 cp/hl	Per ridurre i danni da giallume virotico, da scarsa vigoria e bassa produzione. Trattare 10-14 giorni dopo la caduta dei petali utilizzando circa 6 hl d'acqua per ettaro.
Fragola	Fogliare	2-2,5 cp/hl	Per anticipare e concentrare il periodo di raccolta. Trattare con 5-8 hl/ha di acqua, 4-6 settimane prima del periodo di normale fioritura. Nelle zone solite a freddi improvvisi, si sconsiglia di anticipare la produzione e quindi l'impiego del fitoregolatore.
Pomodoro, melanzana	Fogliare	1-2 cp/hl	Per anticipare e migliorare quali-quantitativamente la produzione. Trattare utilizzando 3-5 hl d'acqua per ettaro.
Carciofo	Fogliare	1-2 cp/hl	Per anticipare e concentrare il periodo di raccolta.
Zucchini	Fogliare	2-4 cp/hl	Per stimolare lo sviluppo e limitare lo stress da freddo. Trattare 4-5 settimane prima della raccolta utilizzando 3-5 hl d'acqua per ettaro.
Lattuga	Fogliare	2-4 cp/hl	Per stimolare lo sviluppo e limitare lo stress da freddo. Trattare 3-4 settimane prima della raccolta.
Patata	Fogliare	0,1 cp/hl Tuberi sezionati 0,5 cp/hl Tuberi interi	Per stimolare l'emissione regolare dei germogli nei tuberi da seme, s'immergono per 10 minuti nella soluzione, asciugando e seminando subito dopo. Per i tuberi provenienti da magazzino di conservazione, lasciare trascorrere 3-4 settimane di pre-germinazione.
Sedano, spinacio	Fogliare	2-4 cp/hl	Per stimolare lo sviluppo e limitare lo stress da freddo. Trattare 4-5 settimane prima della raccolta utilizzando 3-5 hl d'acqua per ettaro.
Colture floreali in campo	Fogliare	1-2 cp/hl	Per anticipare ed aumentare la fioritura, per interrompere la dormienza, per stimolare la crescita ed allungare gli steli, trattare alla comparsa dei primi boccioli fiorali utilizzando 5 hl d'acqua per ettaro. Si raccomanda di effettuare prove preventive al fine di rilevare eventuali sensibilità da parte di alcune specie e/o varietà.
Vite: uva da vino con semi	Fogliare	0,5-1 cp/hl	Per allungare il rachide sulle varietà a grappolo compatto trattare prima della fioritura con tralci di 10-15 cm utilizzando 2-3 ettolitri d'acqua per ettaro. L'allungamento consente una migliore difesa nei programmi di Lotta Integrata contro la Botrytis, grazie ad una migliore aerazione del grappolo. Si raccomanda di effettuare prove preventive al fine di rilevare eventuali sensibilità da parte di alcune varietà.
Carciofo	Fogliare	1-2,5 cp/hl	In caso di gelate, per stimolare la ripresa della coltura, trattare quando la temperatura è ritornata ai valori normali e le piante si sono riprese. Le varietà che meglio rispondono al trattamento sono quelle a capolini verdi, meno bene quelli violetti.

Note aggiuntive prodotto

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle Indicazioni di pericolo ed i consigli di prudenza riportati in etichetta.