

CUPROFIX® C DISPERSS®



CUPROFIX® C DISPERSS® è impiegabile per il controllo della peronospora ed altre patologie quali batteriosi ed antracnosi su numerose colture. Va impiegato con criterio preventivo, sfruttando l'azione citotropica del cymoxanil. La presenza del rame da idrossisolfato UPL, peraltro, permette di apportare dosi di principio attivo per ettaro in linea con le più moderne esigenze tecnico-normative.

COMPOSIZIONE Rame metallo puro 20% (da idrossisolfato)
Cymoxanil puro 4%

FORMULAZIONE Granuli idrodispersibili

INTERVALLO DI SICUREZZA 3 gg per pomodoro da mensa; 7 gg per zucchini, aglio e cipolla; 10 gg per pomodoro da industria; 14 gg per patata; 28 gg per vite.

N° DI REGISTRAZIONE 11637 del 14.03.2003

CONFEZIONE kg 1 - 10

INDICAZIONI DI PERICOLO **ATTENZIONE**
H302+H332 - H319 - H361fd
H410EUH208 - EUH401



COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (kg/ha)	DOSE (g/hL)	NOTE
 Vite davino e datavola	Peronospora, Antracnosi,	2,8 - 3,0	280 - 300	Numero trattamenti/anno: 4. Intervallo minimo: 7 giorni.
 Pomodoro (in campo)	Peronospora, Batteriosi	2,8 - 3,0	280 - 300	Impiegare dallo stadio di 3 - 4 foglie vere fino al 50% di frutti maturi. Numero trattamenti/anno: 6. Intervallo minimo: 7 giorni.
 Zucchini (in campo)	Peronospora, Batteriosi	2,8 - 3,0	280 - 300	Impiegare dallo stadio di 3 - 4 foglie vere fino a quando il 10% dei frutti mostra la tipica colorazione. Numero trattamenti/anno: 4. Intervallo minimo: 7 giorni.
 Patata (in campo)	Peronospora, Batteriosi	2,8 - 3,0	280 - 300	Impiegare dal primo getto basale fino al 50% di foglie brunastre. Numero trattamenti/anno: 5. Intervallo minimo: 7 giorni.
 Aglio, Cipolla (in campo)	Peronospora, Batteriosi	2,8 - 3,0	280 - 300	Impiegare dallo stadio di 3 - 4 foglie vere fino all'inizio della bulbificazione. Numero trattamenti/anno: 4. Intervallo minimo: 7 giorni.
 Rosa (in campo)	Peronospora	2,8 - 3,0	280 - 300	Impiegare dallo stadio di 3-4 foglie sul tronco principale fino ad inizio fioritura. Numero trattamenti/anno: 3. Intervallo minimo: 7 giorni.

- Dose di rame in linea con le nuove esigenze tecnico-normative
- Formulazione DISPERSS®
- Prodotto ad azione preventiva, citotropica e di contatto

