

ACEMUR SP

Insetticida sistemico contro gli afidi
POLVERE SOLUBILE IN ACQUA (SP)

Meccanismo d'azione: IRAC 4°

ACEMUR SP

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 18356 del 05/03/2026

Composizione:

Acetamiprid puro g. 20
Coformulanti q.b. a a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H302 Nocivo se ingerito. H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H361d Sospettato di nuocere al feto. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P264 Lavare accuratamente la pelle dopo l'uso. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. P308+P313: In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il contenuto / recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U.

Poligono Ind. Fondo de Litera, A2, Km 441,6
22520 Fraga (Huesca) Spagna
Tel. +34 973 737377

Stabilimenti di produzione:

RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. - Lleida (Spagna)
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co. Ltd. - Shandong, Cina
Qingdao Rainbow Chemical Co., Ltd. - Qingdao, Shandong, Cina
Ningxia Rainbow Chemical Co., Ltd. - Ningxia, Cina

Distribuito da:

Rainbow Agrosiences Italy S.R.L., Cassano d'Adda (MI), Via Milano n. 12.
Tel. +34 973737377
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN) - Tel. 0464 433705

Contenuto: 5-10-25-50-100-250-300-350-400-500 g; 1-5-10 Kg

Partita n° vedi timbro



ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante le fasi di miscelazione, caricamento e applicazione del prodotto, indossare guanti e indumenti protettivi. Durante le fasi di miscelazione e caricamento, utilizzare anche protezione respiratoria. Dopo l'applicazione non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. In caso di rientro in campo, l'uso di indumenti da lavoro (pantaloni lunghi e maglia a maniche lunghe) e guanti è raccomandato per il lavoratore. Non è consentita l'applicazione manuale.

Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 20 metri da corpi idrici superficiali.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio, adottare una fascia di sicurezza non trattata rispetto all'area non coltivata adiacente, su tutti i bordi della coltura, di 5 metri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un CENTRO ANTIVELENI.

CARATTERISTICHE

ACEMUR SP è un insetticida sistemico per il controllo degli afidi che agisce per contatto ed ingestione. Il prodotto agisce sul sistema nervoso degli insetti ed è caratterizzato da attività citotropica translaminare e da elevata sistemica, pertanto ACEMUR SP consente anche la difesa della vegetazione sviluppatasi dopo il trattamento.

USI AUTORIZZATI, DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO

Applicare mediante irrorazioni avendo cura di bagnare bene tutta la parte aerea della pianta. Effettuare un solo trattamento l'anno.

Coltura	Malattia	Dose (g/hl)	Dose (g/ha)	Volumi d'acqua (L/ha)	Epoca d'impiego	Intervallo di sicurezza (giorni)
Pomodoro, Melanzana	Afide del pomodoro (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>)	25-37,5	187,5	500-800	Da 9 o più apici primari visibili fino a 9 o più palchi fiorali aperti (BBCH 29-69)	7
	Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	25-37,5	187,5	500-1000	Da 9 o più apici primari visibili fino a 9 o più palchi fiorali aperti (BBCH 29-69)	7

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE

Riempire a metà il serbatoio dell'irroratrice con acqua pulita e aggiungere la quantità prevista di ACEMUR SP, quindi aggiungere altra acqua fino a volume desiderato mantenendo la soluzione in costante agitazione. Dopo l'uso lavare accuratamente il serbatoio, la pompa e gli ugelli dell'attrezzatura utilizzata.

GESTIONE DELLA RESISTENZA

L'impiego ripetuto nella stessa area di prodotti appartenenti alla stessa famiglia chimica o che presentano lo stesso meccanismo d'azione può far emergere fenomeni di resistenza. Per evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di parassiti resistenti, si consiglia di alternare o miscelare a questo insetticida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità. Il prodotto non è compatibile con prodotti a reazione alcalina

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Non sono stati testati effetti fitotossici su melanzana. La formulazione dovrebbe essere testata su piccola scala prima di essere applicata all'intera coltura

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**