

Strengthen your crop

syngenta®
Biologicals

BIOSTIMULANT

Megafol™



ENGLISH | NON-MICROBIO PLANT BIOSTIMULANT

CLAIMS: TOLERANCE TO ABIOTIC STRESS (COLD STRESS AND HEAT STRESS). QUALITY TRAITS IMPROVEMENT: MEGAFOL INCREASES THE VEGETATIVE DEVELOPMENT OF THE PLANTS

Ingredients: Vinasse, EC n° 932-215-9 (CMC 6: Food industry by-products); Potassium acetate, CAS n° 127-08-2 (CMC 1: Virgin material substances and mixtures); Urea, CAS n° 57-13-6 (CMC 1); *Ascophyllum nodosum* extract CAS n° 84775-78-0 (CMC 1); Corn steep liquor, CAS n° 66071-94-1 (CMC 1). **Formulation:** Liquid. **Instructions and application rates - Tolerance to abiotic stress:** Foliar Application. Crops: All crops (Broadacres, Woody perennials, Vegetables, Ornamentals and AMP); Application rate: 2-3 l/ha; Application stage: 24-48h before stress and 24-48h after stress, during the whole vegetation period; Application number: 2. Notes: No limit for any specific crop group. Minimum dilution volume: in case of lower volume than 150 l/ha miscibility and localized test are required. Application during flowering: yes. The number of applications refers to a single stress event. To be repeated at each stress event along the crop cycle. **Instructions and application rates - Quality traits improvement:** Foliar Application. Woody perennials, Vegetables, Ornamentals and AMP; Application rates: 2-3 l/ha; Application stage: during vegetative growth; Application number: 1. **CAUTION:** Do not mix with copper on crops sensitive to this element, with the exception of olive trees, grapes, artichoke, tomato. Do not mix with mineral oils. **PROFESSIONAL USE:** For more specific recommendations, contact your local Syngenta representative. www.syngentabiologicals.com. These product application rates are recommendations. We recommend to the farmers to seek counsel from their adviser to adjust the recommendations to their particular situation and to avoid over-fertilisation. **Recommended storage conditions:** Thoroughly mix before use. If stored between 0-35°C, the product does not have any storage problems. **Information on Safety and Environment:** This fertiliser contains urea, which can release ammonia and have an impact on air quality. Depending on local conditions, appropriate remediation measures must be taken. To avoid risks to human health and the environment, please comply with the recommended use instructions of this fertilising product. This product is certified by CerTrust Ltd., certificate No. FB 006436 **Manufacturer:** VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

ITALIANO | BIOTIMOLANTE NON MICROBICO DELLE PIANTE

DICHIARAZIONE: TOLLERANZA ALLO STRESS ABIOTICO (STRESS DA FREDDO E STRESS DA CALORE). MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE: MEGAFOL FAVORISCE LO SVILUPPO VEGETATIVO DELLE PIANTE

Ingredienti: Borianda n. EC 932-215-9 (CMC 6: Sottoprodotti dell'industria alimentare); Potassio acetato n. CAS 127-08-2 (CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo); Urea, n. CAS 57-13-6 (CMC 1); *Ascophyllum nodosum*, estratto n. CAS 84775-78-0 (CMC 1); Corn steep liquor, n. CAS 66071-94-1 (CMC 1). **Formulazione:** Liquida **Istruzioni d'uso: Tolleranza allo stress abiotico:** Applicazione fogliare. Colture: Tutte le colture (colture estensive, colture arboree, colture orticole, ornamentali, piante medicinali e aromatiche). Dose di applicazione: 2-3 l/ha; Periodo di applicazione: 24-48 ore prima dello stress e 24-48 ore dopo lo stress, durante l'intero periodo vegetativo; Numero di applicazioni: 2. Da ripetere ad ogni evento di stress durante il ciclo colturale. Note: Nessun limite per specifici gruppi di colture. Volume minimo di diluizione: in caso di volume inferiore a 150 l/ha sono richiesti test di miscibilità e localizzati. Applicazione durante la fioritura: sì. Il numero di applicazioni si riferisce a un singolo evento di stress. **Istruzioni d'uso: Miglioramento delle caratteristiche qualitative:** Applicazione fogliare. Colture arboree, colture orticole, ornamentali, piante medicinali e aromatiche. Dosi di applicazione: 2-3 l/ha; Fase di applicazione: Fioritura, post-allegagione e ingrossamento dei frutti. Numero di applicazioni: 3. Colture estensive: Dosi di applicazione: 2-3 l/ha; Fase di applicazione: durante la crescita vegetativa; Numero di applicazioni: 1. **ATTENZIONE:** Non miscelare con rame su colture sensibili a questo elemento, ad eccezione di olivo, vite, carciofo, pomodoro. Non miscelare con oli minerali. **PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI:** Per raccomandazioni più specifiche, contattare il vostro rappresentante locale Syngenta. www.syngenta.it. Le istruzioni di utilizzo e i dosaggi sono suggerimenti. Raccomandiamo agli agricoltori di chiedere consiglio al loro consulente in modo da poter adeguare le raccomandazioni alla loro situazione particolare ed evitare l'uso eccessivo di fertilizzanti. **Condizioni di magazzino raccomandate:** Omogeneizzazione accuratamente il prodotto prima di ogni prelievo e prima dell'utilizzo. Immagazzinato tra 0 e 35°C, il prodotto non presenta problemi di conservazione. **Informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente:** Questo concime contiene urea, che può rilasciare ammoniaca e avere ripercussioni sulla qualità dell'aria. A seconda delle condizioni locali, devono essere adottate adeguate misure correttive. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, si prega di rispettare le istruzioni d'uso raccomandate di questo prodotto fertilizzante. Il prodotto è certificato da CerTrust Ltd., certificato n°: FB 006436 **Fabbricante:** VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

FRANÇAIS | BIOTIMULANT NON MICROBIEN DES VÉGÉTAUX

EFFETS ALLÉGÉS: AMÉLIORATION DES CARACTÉRISTIQUES QUALITATIVES: MEGAFOL AUGMENTE LA CROISSANCE VÉGÉTATIVE DES PLANTES. TOLLÉRANCE AUX STRESS ABIOTIQUES (STRESS D'AU FROID ET À LA CHALEUR).

Ingredients: Vinasse, EC n° 932-215-9 (CMC 6: Sous-produits de l'industrie alimentaire); Acétate de potassium, CAS n° 127-08-2 (CMC 1: Substances et mélanges à base de matières vierges); Urée, CAS n° 57-13-6 (CMC 1); Extrait d'*Ascophyllum nodosum*, EC n° 283-907-6 (CMC 1); Liqueur de maïs fermenté, CAS n° 66071-94-1 (CMC 1).

Formulation: Liquide **Injections et doses d'utilisation - Amélioration des caractéristiques qualitatives:** Application foliaire. Plantes ligneuses pérennes et cultures maraîchères et ornementales: Dose d'application: 2-3 l/ha; Période d'application: Floraison, post-nouaison et grossissement des fruits. Nombre d'applications: 3. Cultures céréalières et à grande échelle: Dose d'application: 2-3 l/ha; Période d'application: pendant la croissance végétative; Nombre d'applications: 1. **Instructions et doses d'utilisation - Tollerance aux stress abiotiques:** Application foliaire. Cultures: Toutes cultures (cultures extensives et à grande échelle, plantes ligneuses pérennes et cultures maraîchères et ornementales). Dose d'application: 2-3 l/ha; Période d'application: 24-48 h avant le stress et 24-48 h après le stress, pendant tout le cycle végétatif. Nombre d'applications: 2. Remarques: Aucune restriction pour les groupes spécifiques de cultures. Volume de dilution minimum: 150 l/ha. En cas de volume inférieur, un test de miscibilité et un essai localisé sont nécessaires. Application pendant la floraison: oui. Le nombre d'applications fait référence à un seul événement de stress. À répéter à chaque événement de stress tout au long du cycle de culture. **ATTENTION:** Ne pas mélanger avec du cuivre sur les cultures sensibles à cet élément, à l'exception de l'olivier, de la vigne, de l'artichaut, de la tomate. Ne pas mélanger avec des huiles minérales. **USAGE PROFESSIONNEL:** Contactez votre représentant local Syngenta pour des recommandations plus spécifiques ou consultez notre site internet: www.syngenta.fr. Vous pouvez contacter le centre de renseignement technique de SYNGENTA: 0 825 000 552.

Conditions de stockage recommandées: Bien mélanger avant utilisation. Stocker le produit entre 0 et 35°C afin d'assurer une bonne conservation. **Informations sur la sécurité et l'environnement:** Ce produit fertilisant contient de l'urée, qui peut libérer de l'ammoniac et avoir un impact sur la qualité de l'air. Selon les conditions locales, des mesures d'assainissement appropriées doivent être prises. Pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement, veuillez respecter les instructions d'utilisation recommandées de ce produit fertilisant.

Informations complémentaires: Pour l'élimination des produits non utilisables, faire appel à une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux. Exemple de l'emballage interdit, bien le vider. **France:** Éliminer les emballages vides via une collecte organisée par un service de collecte spécifique (exemple: Adivalor). **Belgique:** Les emballages ainsi rincés seront rangés et stockés dans un endroit sûr puis amenés aux points de ramassage prévus à cet effet (AgriRecover). Ce produit est certifié par CerTrust Ltd., certificat n° FB 006436 **Fabricant:** VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

MODE OF APPLICATION



FOLIAR



Powered by



GEAPOWER®

ESPAÑOL | BIOESTIMULANTE VEGETAL NO MICROBIANO

DECLARACIONES: TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO (ESTRÉS POR FRÍO Y ESTRÉS POR CALOR). MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD: MEGAFOL FAVORECE EL DESARROLLO VEGETATIVO DE LAS PLANTAS
Ingredientes: Vinaza, EC n° 932-215-9 (CMC 6: Subproductos de la industria alimentaria); Acetato de potasio, CAS n° 127-08-2 (CMC 1: Sustancias y mezclas de materiales vírgenes); Urea, CAS n° 57-13-6 (CMC 1); Extracto de *Ascochyllum nodosum* CAS n° 84775-78-0 (CMC 1); Agua de maceración del maíz, CAS n° 66071-94-1 (CMC 1)
Formulación: Líquida

Instrucciones de uso y dosis de aplicación - Tolerancia al estrés abiótico: Aplicación foliar. Cultivos: Todos los cultivos (Cultivos extensivos, perennes leñosos y hortalizas). Dosis de aplicación: 2-3 L/ha; Momento de aplicación: 24-48 horas antes del estrés y 24-48 horas después del estrés, durante todo el período vegetativo; Número de aplicaciones: 2. Notas: Sin limitación para ningún grupo específico de cultivos. Volumen mínimo de dilución: para volúmenes inferiores a 150 l/ha se requieren pruebas de miscibilidad y pruebas localizadas. Aplicación durante la floración: si. El número de aplicaciones se refiere a un único evento de estrés. Repetir en cada evento de estrés durante el ciclo del cultivo.
Instrucciones de uso y dosis de aplicación - Mejora de las características de calidad: Aplicación foliar. Perennes leñosos, Hortalizas, Plantas ornamentales y Plantas Aromáticas y Medicinales. Dosis de aplicación: 2-3 L/ha; Momento de aplicación: Floración, después del cuajado y engorde del fruto. Número de aplicaciones: 3. Cultivos extensivos: Dosis de aplicación: 2-3 l/ha; Momento de aplicación: durante el crecimiento vegetativo; Número de aplicaciones: 1. **PRECAUCIÓN:** No mezclar con cobre en cultivos sensibles a este elemento, con excepción de olivo, vid, alcachofa y tomate. Por evitar con aceites minerales. USO PROFESIONAL: Contacte con su representante local de Syngenta para recomendaciones más específicas. www.syngentabiologicals.com. Estas dosis de aplicación del producto son recomendaciones. Recomendamos a los agricultores que busquen el consejo de su asesor para ajustar las recomendaciones a su situación particular y evitar la sobrefertilización. **Condiciones de almacenamiento recomendadas:** Mezclar bien antes de usar. Si se almacena entre 0-35°C, el producto no presenta problemas de conservación. **Información sobre seguridad y medio ambiente:** Este fertilizante contiene urea, que puede liberar amoníaco y tener un impacto en la calidad del aire. Dependiendo de las condiciones locales, se deben tomar las medidas correctivas apropiadas. Para evitar riesgos para la salud humana y el medio ambiente, por favor cumpla con las instrucciones de uso recomendadas de este producto fertilizante. Este producto está certificado por CerTrust Ltd., certificado n° FB 006436
Fabricante: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

PORTUGUÊS | BIOESTIMULANTE VEGETAL NÃO MICROBIANO

ALÉGAÇÕES: TOLERÂNCIA AO STRESS ABIÓTICO (STRESS PELO FRIO E PELO CALOR). MELHORIA DAS CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE: MEGAFOL PROMOVE O DESENVOLVIMENTO VEGETATIVO DAS PLANTAS
Ingredientes: Vinhaça, EC n° 932-215-9 (CMC 6: Subprodutos da indústria alimentar); Acetato de potássio, CAS n° 127-08-2 (CMC 1: Substâncias e misturas de matérias-primas); Ureia, CAS n° 57-13-6 (CMC 1); Extrato de *Ascochyllum nodosum* CAS n° 84775-78-0 (CMC 1); Água de maceração do milho, CAS n° 66071-94-1 (CMC 1).
Formulação: Líquida

Indicações relativas à sua utilização - Tolerância ao stress abiótico: Aplicação foliar. Culturas: Todas as culturas (Culturas extensivas, plantas lenhosas perenes e hortalizas). Dose de aplicação: 2-3 L/ha; Época de aplicação: 24-48 horas antes da situação de stress e 24-48 horas após a situação de stress, durante todo o período vegetativo; Número de aplicações: 2. Notas: Sem limitação para qualquer grupo específico de culturas. Volume mínimo de diluição: para volumes inferiores a 150 L/ha são necessários testes de miscibilidade e testes localizados. Aplicação durante a floração: sim. O número de aplicações refere-se a um único evento de stress. Repetir em cada situação de stress durante o ciclo da cultura.

Instruções de utilização - Melhoria das características de qualidade: Aplicação foliar. Plantas lenhosas perenes e hortalizas: Dose de aplicação: 2-3 L/ha; Época de aplicação: Floração, após o vingamento e crescimento do fruto. Número de aplicações: 3. Culturas extensivas: Dose de aplicação: 2-3 L/ha; Época de aplicação: durante o crescimento vegetativo; Número de aplicações: 1.

ATENÇÃO: Não misturar com cobre em culturas sensíveis a este elemento, com exceção da oliveira, videira, alcachofa e tomateiro. Não misturar com óleos minerais. Para USO PROFESIONAL: Contacte a empresa Syngenta para recomendações mais específicas (www.syngentabiologicals.com). Estas doses de aplicação do produto são recomendações. Recomenda-se a consulta junto do serviço técnico da empresa ou distribuidor para ajustar as recomendações à sua situação particular e evitar a fertilização excessiva.

Condições de armazenamento recomendadas: Misturar bem antes de usar. Armazenar o produto em local seco e bem ventilado, fora da luz solar direta. Temperatura de armazenamento entre 0-35 °C. **Informação relativa à segurança e ao ambiente:** Este fertilizante contém ureia, que pode libertar amoníaco e afetar a qualidade do ar. Devem ser tomadas medidas correctivas adequadas em função das condições locais. Para evitar riscos para a saúde humana e o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

Este produto é certificado pela CerTrust Ltd., certificado n° FB 006436

Fabricante: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

Production date - production batch: see print on package / **Data di produzione - Lotto di produzione:** vedi stampa su confezione. / **Date de production et lot de production:** voir impression sur l'emballage / **Fecha de producción - lote de producción:** ver impresión en el envase / **Lote e data de produção:** ver embalagem
Expiry Date: 3 years from production date / **Data di scadenza:** 3 anni dalla data di produzione / **Date de péremption:** 3 ans à partir de la date de production / **Fecha de caducidad:** 3 años desde la fecha de fabricación
Data de validade: 3 anos a partir da data de produção

Dispose properly of packaging after use / Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso / Éliminer l'emballage de manière adéquate après utilisation / Desechar adecuadamente el envase después de su uso / A embalagem vazia deve ser depositada num ponto de receção destinado a esse fim.

Foliar application / Applicazione fogliare / Application foliaire / Aplicación foliar / Aplicação foliar

MEGAFOL

FR | EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

IT | EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EN | EUH208 Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction. EUH210 Safety data sheet available on request.

ES | EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

PT | EUH208 Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reacção alérgica. EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

Distributore in Italia: Syngenta Italia S.p.A., Viale Fulvio Testi 280/6 - Milano - Tel. 02-33444.1

Distributeur en France: Syngenta France S.A., 1228 Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, S.A. au capital de 103 516 413 EUR, R.C.S. – RSAC Toulouse 443 716 832 France Numéro de TVA intra-com.: FR 11 443 716 832 N° urgence Syngenta: 0 800 803 264

Distribuidor en España: Syngenta España, S.A., c/ Ribera del Loira, 8 – 10, 28042 – MADRID, España. Teléfono: (+34) 91 387 64 10

Distribuidor em Portugal: Syngenta Crop protection - Soluções para a Agricultura, Lda, Av. D. João II Edifício Adamastor, Torre B, nº9-I, 13º piso 1990-079 Lisboa Tel. 21 794 32 00 www.syngenta.pt

Manufacturer / Fabbicante / Fabricant / Fabricante / Fabricante: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

Volume / Volumen (10 l) / net weight / peso netto / masse nette / peso neto / peso líquido (12,2 kg)



TANCA	TAPPO
HOPE 2	HOPE 2